



Sanglier

Nom latin : Sus scrofa

Nom espagnol : Jabali

Nom anglais : Boar

Statut : Espèce classée dangereuse et chassable



Le sanglier fait parti des espèces classées « grands gibiers ». La diminution de la population de ses prédateurs, provoque une hausse de ses effectifs. Ainsi, un plan de gestion contribue à réguler les populations, mais a aussi pour but de réduire les dégâts faits sur les cultures. En revanche, le sanglier ne fait pas de dégâts en milieu forestier. Au contraire, il joue un rôle important et positif sur l'équilibre de la forêt. Il laboure et aère le sol, favorisant ainsi la germination des essences forestières.

C'est également un animal nécrophage (qui mange des cadavres) ce qui contribue à nettoyer l'environnement. Le sanglier ne transpire pas, il est donc nécessaire pour lui de se plonger quotidiennement dans une cuvette (trou de terre) plus ou moins remplie d'eau appelée « souilles », afin de réguler sa température corporelle. Ces bains de boues lui permettent également de se débarrasser des parasites cutanés (puces, tiques...).



© Chloé Brinon

El jabalí forma parte de las especies clasificadas como "caza mayor". La disminución del número de depredadores provoca el aumento de la población. Mediante un plan de gestión se contribuye a regular la población, y además se crean puntos de alimentación con el objetivo de reducir los daños en los cultivos. En cambio, el jabalí no provoca daños en el medio forestal, al contrario, desempeña un rol importante y positivo en el equilibrio del bosque. Labra y airea el suelo, favoreciendo la germinación de las especies forestales.

Además es un animal necrófago (que se alimenta de cadáveres) contribuyendo a limpiar su hábitat. El jabalí no suda, por lo tanto necesita zambullirse cotidianamente en algún charco más o menos lleno de agua (llamado bañadero) para regular su temperatura corporal. Estos baños de barro también le permiten deshacerse de los parásitos cutáneos.



Le saviez-vous ?

Les sangliers peuvent se reproduire avec les cochons domestiques

Le nid du sanglier où naissent les marcassins est appelé « le chaudron »



De 40 à 200Kg

Moyenne :

Mâle : de 60 à 200 kg
Femelle : de 40 à 100 kg

Poids de naissance : 750 g



Maturité sexuelle :

A partir de 8 mois

Rut : possible toute l'année

Gestation : 3 mois 3 semaines et 3 jours

Mise bas :

2 à 10 marcassins/portée



Omnivore :

Glands
Fruits
Racines
Tubercules
Viande



Longévité :

Une quinzaine d'année



Forêts, prés, zones humides...

Le sanglier a une grande capacité d'adaptation



L'Homme
Le Loup
L'Ours brun