


Construction des fiches espèces

***Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)**
La Thécia du Bouleau



Statut réglementaire

LR Europe	LR France	DHFF	Protection Nationale
LC	LC	-	-

Etat des connaissances en 2016

MAUVAIS

Identification Envergure = 32 - 38 mm


FACILE

Période de vol

Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	-------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Période de vol majoritaire Période de vol occasionnelle

Carte de répartition en Aquitaine



Où rencontrer l'espèce ?
Jardins, haies, bois clairs, broussailles et jardins où pousse la plante-hôte majoritaire (*Prunus spinosa*). Notée également sur d'autres *Prunus* (*P. padus*, *P. domestica*, *P. avium*).

Altitudes :
Jusqu'à 2 000 m.

Zone prioritaire de recherche :
Toute l'Aquitaine. Semble moins abondant voire absent dans les zones de pinèdes en contexte sableux (Triangle landais et bord de côte).

Conseils de recherche / détermination :
- Imago difficile à observer.
- Privilégier la recherche d'œufs en hiver sur les pieds de *Prunus*.
- Œufs d'un blanc pur très souvent sur les jeunes branches, à l'aisselle d'un rameau ou près d'un bourgeon.

Confusions possibles :
Attention aux œufs de *Graphium opacum* qui pond sur la même plante-hôte : œufs blancs avec une dépression au milieu (blanc pur et bombés pour *T. opacum*).

Rhopalocères - Zygaenidae

Etat des connaissances sur la répartition de l'espèce en Aquitaine à partir des données recensées pour le pré-atlas.

Facilité d'identification :
Facile / Moyenne / Difficile.

Critères de validation des données :

Une photo peut être demandée	A vue	Capture et relâche sur le terrain	Analyse des pièces génitales
			GENITALIA

Période de vol basée sur la littérature et adaptée aux observations réalisées en Aquitaine.

Éléments pour faciliter l'observation et la détermination de l'espèce. Se reporter aux guides de détermination et références bibliographiques pour plus de détails.

Espèces ressemblantes pouvant prêter à confusion. Se reporter aux guides de détermination pour voir les critères précis de différenciation.

Les espèces très proches sur les critères externes sont regroupées dans des fiches « Complexes ».

Carte de répartition de l'espèce en mailles 10x10 km. Les données sont échelonnées sur deux périodes : 1995-2004 et 2005-2015.

Pour les **rhopalocères**, une fiche espèce a été réalisée pour toute espèce dont une donnée est connue en Aquitaine (y compris données antérieures à 1995).

Pour les **Zygaenidae**, une fiche a été réalisée pour toutes les espèces, y compris celles dont aucune donnée n'est connue mais dont la présence est potentielle (connue dans les départements limitrophes par exemple).