

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

Le Miroir



Van Halder I., 2007

Statut réglementaire

LR Europe	LR France	DHFF	Protection Nationale
LC	LC	-	-

Etat des connaissances en 2016

MOYEN

Identification

Envergure = 32 - 36 mm




FACILE

Période de vol



■ Période de vol majoritaire ■ Période de vol occasionnelle

Carte de répartition en Aquitaine



Données de présence à la maille
10X10 km L93

● 1995-2004
● 2005-2015



0 20 40 60 80 km

Réalisation LPO Aquitaine, CEN Aquitaine
Mailles atlas: source INPN
Limites départementales: source ©OpenStreetMap

Où rencontrer l'espèce ?

Landes, marais, tourbières et clairières humides riches en Molinie (*Molinia caerulea*).

Chenille essentiellement sur *Molinia caerulea*.

Altitudes :

Jusqu'à 1 200 m dans la bibliographie. Rarement au-dessus de 1 000 m en Aquitaine.

Zone prioritaire de recherche :

Bien présente en Gironde et dans le triangle landais, l'espèce semble plus localisée ailleurs, mais sa répartition en Dordogne, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques est à affiner.

Conseils de recherche / détermination :

L'espèce a un vol sautillant très typique où le revers clair des ailes contraste avec le noir du dessus. Une fois posée elle est facile à reconnaître à ces grandes taches blanches entourées de noir (comme des miroirs) sur le dessous des ailes.

Confusions possibles :

Le dessous peut ressembler à celui de *Carterocephalus palaemon*. Le dessus en revanche est bien différent (brun avec quelques petites taches claires).