

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

(Groupe des Cuivrés)

LYCAENIDAE



Nombre
de génération(s)
par an
2 à 4



Milieux de vie
milieux ouverts

Protocoles
concernés



Comment le reconnaître ?

L'adulte

- Envergure: 25-29 mm.
- Apparence: dessus des ailes antérieures orange vif ponctué de points noirs et bordé de brun. La coloration du dessus des ailes postérieures est inversée: les ailes sont brunes avec une bande orange sur la bordure postérieure et parfois de petits points bleus chez la femelle. Le dessous des ailes postérieures est beige avec de petits points noirs. Les deux sexes sont assez semblables mais la femelle est plus brillamment colorée que le mâle.

La chenille

- Taille: jusqu'à 15 mm au dernier stade.
- Apparence: difficilement différentiable des chenilles des autres lycènes. Souvent verte, parfois rougeâtre, avec une ligne dorsale et des lignes latérales rouges (quelquefois absentes).
- Plantes hôtes: petite oseille, oseille des prés, patience sauvage, rumex.



Chenille du Cuivré commun

Risque de confusion

Il existe de nombreuses espèces de Lycènes orangés. Toutes ces espèces, difficiles à distinguer entre elles, sont regroupées dans les suivis sous le nom de « Cuivrés »*.

Le saviez vous ?

Observable sur une très longue période de l'année, on voit souvent ce petit papillon de se réchauffer au soleil. Pour cela, il entrouvre ses ailes à 90°, puis tourne sur lui-même afin de trouver le meilleur angle pour recevoir les rayons du soleil. Les mâles de Cuivré commun sont très insistants même lorsque les femelles ont déjà été fécondées, aussi lorsqu'elles aperçoivent un congénère, les femelles s'immobilisent et referment leurs ailes pour passer inaperçues.

Cuivré commun:

1. Dessus des ailes femelle
2. Dessous des ailes
3. Accouplement

