

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

L'Argus bleu – L'Azuré de la Bugrane – L'Azuré commun



Soulet D., 2011

Statut réglementaire

LR Europe	LR France	DHFF	Protection Nationale
LC	LC	-	-

Etat des connaissances en 2016

BON


Identification

Envergure = 24 - 36 mm




MOYENNE

Période de vol



Carte de répartition en Aquitaine



0 20 40 60 80 km

Réalisation LPO Aquitaine, CEN Aquitaine
Mailles atlas: source INPN
Limites départementales: source ©OpenStreetMap

Où rencontrer l'espèce ?

Tous types de milieux ouverts, bois clairs, même en ville. Chenille sur de nombreuses Fabacées (*Astragalus*, *Medicago*, *Lotus*, ...)

Altitudes :

Jusqu'à 2 200 m

Zone prioritaire de recherche :

Toutes les mailles où l'espèce n'a pas été recensée. *Polyommatus icarus* est a priori présent sur toute l'Aquitaine.

Conseils de recherche / détermination :

Les imagos sont facilement visibles pendant les heures chaudes, effectuant des vols rapides de fleurs en fleurs. Par temps couvert, le matin ou en fin de journée, on peut les observer posés (souvent la tête en bas) sur les graminées.

Confusions possibles :

Risques importants de confusions avec *Polyommatus thersites*, *P. escheri*, *P. eros* (femelles) et *Lysandra bellargus* sur les habitats thermophiles et en montagne. L'absence d'un point cellulaire sur le revers de l'aile antérieure n'est pas toujours valable = forme *icarinus* (20% des *P. icarus* d'Europe de l'Ouest). Privilégier la combinaison de plusieurs critères.