

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Le Fadet commun – Le Procris



Van Halder I., 2010

Statut réglementaire

LR Europe	LR France	DHFF	Protection Nationale
LC	LC	-	-

Etat des connaissances en 2016

BON

Identification

Envergure = 28 - 34 mm



FACILE


Période de vol



■ Période de vol majoritaire

■ Période de vol occasionnelle

Carte de répartition en Aquitaine



Données de présence à la maille 10X10 km L93

- 1995-2004
- 2005-2015



0 20 40 60 80 km

Réalisation LPO Aquitaine, CEN Aquitaine
Mailles atlas: source INPN
Limites départementales: source ©OpenStreetMap

Où rencontrer l'espèce ?

Grande diversité d'habitats : pelouses sèches, friches, prairies, clairières, etc.

Chenille sur diverses Poacées.

Altitudes :

Jusqu'à 2 000 m.

Zone prioritaire de recherche :

Présent partout en Aquitaine, le Fadet commun est à rechercher dans les mailles où il n'a pas encore été noté.

Conseils de recherche / détermination :

Ce petit papillon discret ne présente pas de difficulté majeure mais peut passer inaperçu. A rechercher dans les prairies où il se pose souvent, ailes fermées, montrant le revers caractéristique de ses ailes postérieures marquées d'une virgule blanche.

Confusions possibles :

Souvent confondu avec le Myrtil (*Maniola jurtina*) ou l'Amaryllis (*Pyronia tithonus*), il s'en distingue nettement par sa taille inférieure, la couleur orange du dessus des ailes bien visible et par le bord de ses ailes postérieures non découpé.