

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

La Mélitée du Plantain



Sannier M., 2009

Van Halder I., 2010

Statut réglementaire

LR Europe	LR France	DHFF	Protection Nationale
LC	LC	-	-

Etat des connaissances en 2016



MOYEN


Identification

Envergure = 30 - 40 mm



MOYENNE


Période de vol


 Période de vol majoritaire

 Période de vol occasionnelle

Carte de répartition en Aquitaine



0 20 40 60 80 km

 Réalisation LPO Aquitaine, CEN Aquitaine
Mailles atlas: source INPN
Limites départementales: source ©OpenStreetMap

Où rencontrer l'espèce ?

Pelouses, prairies et friches fleuries.
Chenille sur *Plantago*.

Altitudes :

Jusqu'à 1 000 m.

Zone prioritaire de recherche :

Beaucoup de mailles vides pour cette mélitée normalement présente sur toute l'Aquitaine. L'espèce est à chercher surtout en Dordogne et Lot-et-Garonne ainsi que sur la zone du piémont pyrénéen.

Conseils de recherche / détermination :

La Mélitée du plantain est une espèce pionnière qui va facilement s'installer sur des friches agricoles récentes. Elle est commune tant que le couvert végétal n'est pas trop dense. Les chenilles forment des nids communautaires bien visibles au pied des plantains. Leur tête rouge est caractéristique.

Confusions possibles :

Comme pour toutes les mélitées, un examen attentif est nécessaire. *M. cinxia* se distingue des autres mélitées par la présence de points noirs bien visible sur le dessus des ailes postérieures. Attention au Damier de la Succée (*Euphydryas aurinia*) qui possède également cette série de points noirs, mais dont le revers et la coloration du dessus est différent.