

# *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)

## Le Gazé



Gourvil P-Y., 2007

### Statut réglementaire

LR Europe	LR France	DHFF	Protection Nationale
LC	LC	-	-

### Etat des connaissances en 2016

MOYEN

### Identification

Envergure = 50 - 70 mm

FACILE




### Période de vol



■ Période de vol majoritaire

■ Période de vol occasionnelle

### Carte de répartition en Aquitaine



Données de présence à la maille  
10X10 km L93

● 1995-2004

● 2005-2015



0 20 40 60 80 km

Réalisation LPO Aquitaine, CEN Aquitaine  
Mailles atlas: source INPN  
Limites départementales: source ©OpenStreetMap

### Où rencontrer l'espèce ?

Milieus bocagers extensifs pourvus de haies de Rosacées, lisières arbustives, vergers.

Chenille sur arbres et arbustes de la famille des Rosacées, notamment *Prunus spinosa* et *Crataegus monogyna*.

### Altitudes :

Jusqu'à 1 900 m.

### Zone prioritaire de recherche :

Essentiellement observée au nord de l'Aquitaine (Gironde et Dordogne) et sur le piémont pyrénéen, l'espèce est à rechercher partout où ses habitats sont présents.

### Conseils de recherche / détermination :

L'unique génération vole sur une courte période. L'imago se distingue par un vol assez rapide, mais est souvent observé en fin de journée posé sur des fleurs ou l'extrémité de branches d'arbres. En période d'activité, à rechercher sur les fleurs roses ou pourpres de Fabacées et de scabieuses.

### Confusions possibles :

Sa grande taille et ses ailes blanches nervurées de noir le distinguent aisément de toute autre espèce.