

Buteo buteo

Nom latin : *Buteo buteo*

Nom vernaculaire : Buse variable

Rang taxonomique : Espèce

Description :

En vol les ailes et la queue sont arrondies. Variation de couleurs au cours des saisons, allant du brun foncé au blanc presque dur.



Titre de la photo : Buteo buteo

Source de la photo : Jacques Laurens (GOR)

Lignée taxonomique :

Eukarya => Unikonta => Opisthokonta => Chordata => Vertebrata => Aves => Acciptridae => Buteo buteo

Milieu de vie du taxon :	Définition
Chênaies blanches	Forêts méditerranéennes caducifoliées dont la strate arborescente est composée principalement de Chêne pubescent (<i>Quercus pubescens</i> L.)
Hêtraies	Forêts méditerranéennes caducifoliées dont la strate arborescente est composée principalement de Hêtre (<i>Fagus sylvatica</i>)
Milieu urbain	Milieus à forte anthropisation mais où certaines espèces ont cependant réussi à s'adapter à la proximité de l'homme.
Pineraie	Egalement appelée Pinède ou Pinaie, il s'agit de forêts méditerranéennes sempervirentes dont la strate arborescente est composée principalement de Pin (<i>Pinus pinea</i> et <i>Pinus halepensis</i>)
Prairies maritimes	Prés humides proches du littoral, verts en hiver et printemps seulement. L'infiltration d'eau douce en automne permet le développement d'une pelouse basse.
Suberaies	Forêts méditerranéennes sempervirentes dont la strate arborescente est composée principalement de Chêne-liège (<i>Quercus suber</i>)

Caractéristiques du taxon :

Ecologie :

Comportement :

Période d'activité : Diurne,

Distribution : Afrique, Asie, Bassin Méditerranéen, Europe,

Durée de vie : 25 ans,

Habitat : Forêts et petits bois, Milieux ouverts,

Migration : Sédentaire,

Régime alimentaire : Carnivore (lézards, souris, campagnols, mulots), Charogne en période de pénurie,

Morphologie :

Couleur de l'animal : Variable du brun-noir uni au blanc presque dur,

Poids : 750 à 1050 g (mâle),

Queue :

Aspect de la queue : courte et arrondie finement barrée,

Taille de l'animal :

Envergure : 113 à 128 cm,

Environ 50-57cm,

Reproduction :

Nombres de nichées par an : 1,

Ponte : 2-3 oeufs blancs tachetés de brun,

Période de reproduction : Mars-Aout,

Gestion du milieu :

La buse maintient une population stable.

Remarque :

Les buses sont souvent observées sur les bords de routes et notamment des autoroutes où elles se perchent au sommet des arbres ou des poteaux de clôture afin repérer leurs proies.