

# Calao papou

*Rhyticeros plicatus*

Le **Calao papou** (*Rhyticeros plicatus*) est un grand oiseau vivant sur le toit de la forêt de Wallacea et la Mélanésie. Son nom local en Tok Pisin est kokomo.

Son nom anglais commémore Edward Blyth (1810-1873), zoologue anglais et conservateur du Musée de la Société Asiatique du Bengale.

## Sommaire

**Description**

**Répartition**

**Taxinomie**

**Liens externes**

## Description

Pouvant atteindre jusqu'à 91 cm de longueur, le mâle adulte a principalement un plumage noir avec une tête dorée ou orange, une gorge et une queue blanches. Ses iris sont de couleur rougeâtre et son œil est entouré d'une peau bleue et nue. La femelle est généralement plus petite, de couleur principalement noire, avec une gorge et une queue blanches. Les deux sexes ont une très grande crête et un bec de couleur cornée. Les jeunes oiseaux des deux sexes ressemblent au mâle. Les adultes ont jusqu'à huit plis sur leur crête pâle, selon l'âge qu'ils ont, alors que les jeunes oiseaux n'en ont aucun.

En vol, le son de ses ailes est fort et distinctif, un bruit de précipitation qui a été comparé au bruit de la vapeur s'échappant d'une locomotive. Le calao papou a un large éventail de grognements gutturaux et de rires.

Son régime se compose principalement de fruits, en particulier de figes, parfois complétés d'insectes et d'autres petits animaux.

## Répartition

### *Rhyticeros plicatus*



Calao papou femelle (*Rhyticeros plicatus*)

### Classification (COI)

<u>Règne</u>	<u>Animalia</u>
<u>Embranchement</u>	<u>Chordata</u>
<u>Sous-embr.</u>	<u>Vertebrata</u>
<u>Classe</u>	<u>Aves</u>
<u>Ordre</u>	<u>Bucerotiformes</u>
<u>Famille</u>	<u>Bucerotidae</u>
<u>Genre</u>	<u><i>Rhyticeros</i></u>

#### Nom binominal

***Rhyticeros plicatus***

(J.R. Forster, 1781)

Statut de conservation **UICN**

On retrouve cette espèce dans les forêts de basse altitude, avec un niveau de la mer entre 1 200 et 1 500 m, dans les Moluques, la Nouvelle-Guinée, l'archipel Bismarck et plus à l'est que les îles Salomon. C'est la seule espèce vivante de Nouvelle-Guinée et l'un des plus grands oiseaux volants de la région.



**LC : Préoccupation mineure**

Statut CITES



Annexe II, Rév. du 11/06/1992

## Taxinomie



Mâle.

D'après Alan P. Peterson, cette espèce est constituée des six sous-espèces suivantes :

- *Rhyticeros plicatus dampieri* Mayr, 1934 ;
- *Rhyticeros plicatus harterti* Mayr, 1934 ;
- *Rhyticeros plicatus jungei* Mayr, 1937 ;
- *Rhyticeros plicatus mendanae* Hartert, 1924 ;
- *Rhyticeros plicatus plicatus* (J.R. Forster, 1781) ;
- *Rhyticeros plicatus ruficollis* (Vieillot, 1816).

Le Calao à gorge claire (*Rhyticeros subruficollis*) était initialement considéré comme un sous-espèce de *Rhyticeros plicatus*.

### synonyme

*Aceros plicatus*

## Liens externes

- **(en)** Référence Congrès ornithologique international : *Rhyticeros plicatus* dans l'ordre Bucerotiformes (consulté le 16 mai 2015)
- **(en)** Référence Alan P. Peterson : *Rhyticeros plicatus* dans Bucerotiformes (<http://www.zoonomen.net/avtax/buce.html>)
- **(en)** Référence Tree of Life Web Project (<http://tolweb.org/tree/phylogeny.html>) : *Rhyticeros plicatus* (<http://tolweb.org/Rhyticeros+plicatus>)
- **(fr+en)** Référence Avibase (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Rhyticeros plicatus* (J.R. Forster, 1781) (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=524408DFC99550C2>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=524408DFC99550C2>)) (consulté le 26 avril 2016)
- **(fr+en)** Référence ITIS : *Rhyticeros plicatus* (J. R. Forster, 1781) (<http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=707787>) (+ version anglaise )
- **(en)** Référence Animal Diversity Web : *Rhyticeros plicatus* ([http://animaldiversity.org/accounts/Rhyticeros\\_plicatus/](http://animaldiversity.org/accounts/Rhyticeros_plicatus/))
- **(en)** Référence UICN : espèce *Rhyticeros plicatus* (J.R. Forster, 1781) (<http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22682544>) (consulté le 16 mai 2015)
- **(en)** Référence CITES : espèce *Rhyticeros plicatus* (J.R. Forster, 1781) ([http://www.speciesplus.net/#/taxon\\_concepts/7050/legal](http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/7050/legal)) (+ répartition ([http://www.speciesplus.net/#/taxon\\_concepts/7050/distribution](http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/7050/distribution))) (sur le site de Species+ (<http://www.speciesplus.net/>)) (consulté le 16 mai 2015)

Sur les autres projets Wikimedia :

*Calao papou* ([https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Category:Rhyticeros\\_plicatus?uselang=fr](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Category:Rhyticeros_plicatus?uselang=fr)), sur Wikimedia Commons

*Calao papou*, sur Wikispecies

- **(fr)** Référence CITES : taxon *Aceros plicatus* (<http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=2392>) (sur le site du ministère français de l'Écologie)
- **(en)** Référence Fonds documentaire ARKive (<http://www.arkive.org/>) : *Aceros plicatus* (<http://www.arkive.org/en/Aceros-plicatus/>)
- **(fr)** Référence Oiseaux.net : *Aceros plicatus* (<http://www.oiseaux.net/oiseaux/calao.papou.html>) (+ répartition (<http://maps.oiseaux.net/calao.papou.html>))

---

Ce document provient de « [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calao\\_papou&oldid=140685611](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Calao_papou&oldid=140685611) ».

**La dernière modification de cette page a été faite le 15 septembre 2017 à 15:36.**

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.