

Probosciger aterrimus

Le **Cacatoès noir** (*Probosciger aterrimus*), aussi appelé **Microglosse noire**, est une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae, l'unique représentante du genre ***Probosciger***. Cette classification a été confirmée par des études génétiques (Brown & Toft [1999] et Astuti [2006]).

Sommaire

Description

Alimentation

Répartition et habitat

Comportement

Reproduction

Cri et utilisation de percussion

Longévité

Animal de compagnie

Conservation

Sous-espèces

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

Description



Cacatoès noir en vol.

Adulte, c'est l'un des plus grands perroquets. Il s'agit d'un oiseau de 50 à 70 cm de long pesant entre 500 g et 1 kg. Le Cacatoès noir se caractérise par sa couleur noire (y compris le bec et les pattes), sa grande huppe et un des plus grands becs (9 cm de long) chez les perroquets ; et seul l'Ara hyacinthe a un bec plus gros que le sien. Son bec a la particularité d'avoir une partie

Probosciger aterrimus



Probosciger aterrimus

Classification (COI)

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Classe	<u>Aves</u>
Ordre	<u>Psittaciformes</u>
Famille	<u>Cacatuidae</u>

Genre

Probosciger

Kuhl, 1820

Espèce

Probosciger aterrimus

(Gmelin, 1788)

Répartition géographique

inférieure qui peut s'encastrer dans la partie supérieure, ce qui permet à l'oiseau de coincer une noix entre sa langue (rouge à extrémité noire) et sa mandibule supérieure et de l'ouvrir avec sa mandibule inférieure. Il a une tache rouge sur chaque joue correspondant à une zone dénudée de plumes. Celle-ci change de couleur lorsqu'il est inquiet, malade ou nerveux.

Le dimorphisme sexuel est peu marqué : la mandibule supérieure du bec est plus petite chez la femelle.

Les immatures présentent un bec blanc grisâtre et des couvertures blanc jaunâtre.

Alimentation

Il se nourrit de graines, de baies, de plantes, d'insectes et de larves d'insectes. Son bec et sa langue sont conçus pour facilement ouvrir des noix et les extraire de leurs coquilles.

Répartition et habitat

Cet oiseau peuple les îles Aru, la Nouvelle-Guinée et la péninsule du cap York (Australie). Les sous-espèces de Nouvelle-Guinée et des îles avoisinantes (*goliath* et *stenolophus*) sont de plus en plus rares dans la nature où elles sont très fortement menacées par un trafic en direction des pays du Moyen-Orient et ceux de l'ancien bloc soviétique.

Il fréquente les forêts tropicales humides, mais aussi les forêts sèches.

Comportement

Il vit généralement seul, en couple ou en petites bandes de 5 à 7 individus.

Reproduction

Le cacatoès se reproduit à partir de quatre ans. La période de reproduction va d'août à janvier ; la femelle pond un œuf unique dans le creux d'un arbre situé très haut qui servira d'une année à l'autre. L'œuf est couvé alternativement par les deux parents pendant 30 jours. L'oisillon restera au nid pendant 100 à 110 jours. L'oisillon ne sera pas capable de commencer à voler pendant encore deux semaines.

Cri et utilisation de percussion

Dans la nature, cet oiseau utilise quatre cris différents très perçants s'entendant de loin. Il a aussi la particularité, observée uniquement pour les populations de la péninsule de York, de taper avec une branche de 20 cm environ qu'il fabrique sur les troncs d'arbres pour produire un bruit sourd qui est entendu à 100 m à la ronde et qui lui sert pour courtiser les femelles. En exceptant l'homme, il s'agit du seul animal connu à utiliser un



aire de répartition

Statut de conservation UICN



LC : Préoccupation mineure

Statut CITES

 Annexe I, Rév. du 22/10/1987

instrument de percussion de sa fabrication pour jouer un morceau rythmique^{١,٢,٣}.

Longévité

Cet oiseau peut vivre jusqu'à 100 ans en moyenne.

Animal de compagnie

À cause de son aspect, c'est un animal de compagnie très apprécié, surtout aux États-Unis, mais très rarement en France. Il s'y reproduit très mal et doit rester isolé.

Conservation

Il existe un Programme européen pour les espèces menacées (EEP) de l'Association européenne des zoos et aquariums (EAZA) consacré à cette espèce. Celui-ci est coordonné par le ZooParc de Beauval, en France⁴.

Sous-espèces

D'après la classification de référence (version 5.2, 2015) du Congrès ornithologique international, cette espèce est constituée des quatre sous-espèces suivantes (ordre phylogénique) :

- *Probosciger aterrimus stenolophus* (Oort, 1911) ;
- *Probosciger aterrimus goliath* (Kuhl, 1820) ;
- *Probosciger aterrimus aterrimus* (Gmelin, 1788) ;
- *Probosciger aterrimus mcgivrissus* (Mathews, 1912) ;

Notes et références

- ↑ « Cacatoès noir, artiste batteur » (http://www.humanite-biodiversite.fr/article/cacatoes-noir-artiste-batteur), sur *humanite-biodiversite.fr*, 10 juillet 2017 (consulté le 30 juin 2019).
- ↑ Shaena Montanari, « Le cacatoès noir, rock star du royaume animal » (https://www.nationalgeographic.fr/animaux/2017/06/le-cacatoes-noir-rock-star-du-royaume-animal), sur *National Geographic*, 5 juillet 2017 (consulté le 30 juin 2019).
- ↑ (en) Robert Heinsohn, Christina N. Zdenek, Ross B. Cunningham, John A. Endler et Naomi E. Langmore, « Tool-assisted rhythmic drumming in palm cockatoos shares key elements of human instrumental music », *Science Advances*, vol. 3, n^o 6,‎ 1^{er} juin 2017 (ISSN 2375-2548 (http://worldcat.org/issn/2375-2548&lang=fr), DOI 10.1126/sciadv.1602399 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fsciadv.1602399), lire en ligne (http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1602399.full), consulté le 30 juin 2019).
- ↑ (en) « EAZA Activities > Collection Planning > EEPs and ESBs » (http://eaza.portal.isis.org/ACTIVITIES/CP/Pages/EEPs.aspx), sur *eaza.portal.isis.org* (consulté le 15 mai 2016)

Voir aussi

Bibliographie

- J. M. Gimenez (2008) *Perroquets*, . . .

Sur les autres projets Wikimedia :

 *Cacatoès noir* (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Probosciger_aterrimu

- (en) D. M. Brown & C. A. Toft (1999), « Molecular systemics and biogeography of the cockatoos (Psittaciformes:Cacatuidae) », *The Auk*, vol. 116, p. 141-157.
- (en) D. Astuti, N. Azuma, H. Suzuki et S. Higashi (2006), « Phylogenetic Relationships within Parrots (Psittacidae) Inferred from Mitochondrial Cytochrome-b Gene Sequences », *Zool. Sci.*, vol. 23, p. 191-198.

Liens externes

- (fr) Référence *Oiseaux.net* : *Probosciger aterrimus* (<https://www.oiseaux.net/oiseaux/cacatoes.noir.html>) (+ répartition (<https://www.oiseaux.net/maps/cacatoes.noir.html>))
- (en) Référence *Congrès ornithologique international* : *Probosciger aterrimus* dans l'ordre Psittaciformes (consulté le 16 mai 2015)
- (en) Référence *Zoonomen Nomenclature Resource* (<http://www.zoonomen.net>) (Alan P. Peterson) : *Probosciger aterrimus* dans Psittaciformes (<http://www.zoonomen.net/avtax/psit.html>)
- (fr+en) Référence *Avibase* (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Probosciger aterrimus* (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=ADC0F2618675AC3B>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=ADC0F2618675AC3B>))
- (en) Référence *CITES* : espèce *Probosciger aterrimus* Gmelin, 1788) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/8306/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/8306/distribution) sur *Species+*) (consulté le 16 mai 2015)
- (en) Référence *Animal Diversity Web* : *Probosciger aterrimus* (http://animaldiversity.org/accounts/Probosciger_aterrimus/)
- (en) Référence *NCBI* : *Probosciger aterrimus* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=141839)
- (en) Référence *UICN* : espèce *Probosciger aterrimus* Gmelin, 1788) (<https://api3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22684723>) (consulté le 16 mai 2015)
- [honolulu zoo.org](http://www.honolulu zoo.org) (http://www.honolulu zoo.org/palm_cockatoo.htm)
- [funnyfarmexotics.com](http://www.funnyfarmexotics.com) (<http://www.funnyfarmexotics.com/PALM/patoc.htm>)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cacatoès_noir&oldid=160533837 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 30 juin 2019 à 11:49.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.