

Faisan argenté

Lophura nycthemera

Le **Faisan argenté** (*Lophura nycthemera*) est une espèce d'oiseaux de la famille des Phasianidae, d'une longueur d'environ 125 cm. Il existe 17 sous-espèces réparties dans tout le sud-est asiatique.

Sommaire

- Description
- Alimentation
- Comportement non social
- Comportement social
- Nidification
- Distribution
- Habitat
- Sous-espèces
- Statut, conservation
- Bibliographie
- Liens externes

Description

Alimentation

Son régime comporte une large gamme d'aliments : bourgeons, boutons floraux, fleurs, feuilles, baies, fruits, graines, herbes, insectes, vers, limaces, lézards et autres petits reptiles avec une consommation plus nettement axée sur les racines, bulbes, rhizomes et tubercules en hiver.

Comportement non social

La recherche de nourriture a lieu tôt le matin et tard le soir. Le soir, de petits groupes regagnent les dortoirs et juchent ensemble dans les arbres, à cinq ou six mètres de haut, pour y passer la nuit.

Lophura nycthemera



Faisan argenté

Classification (COI)

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Sous-embr.	<u>Vertebrata</u>
Classe	<u>Aves</u>
Ordre	<u>Galliformes</u>
Famille	<u>Phasianidae</u>
Genre	<u><i>Lophura</i></u>


Nom binominal

Lophura nycthemera
(**Linnaeus, 1758**)

Statut de conservation UICN

Comportement social

L'espèce est polygame et territoriale, chaque mâle revendiquant un territoire par l'émission de cris sonores et de battements d'ailes puissants. Les coqs se livrent à des combats acharnés pour défendre leur territoire et accaparer de deux à cinq femelles afin de constituer un harem. Le mâle s'accouple avec chaque femelle, chacune assumant seule les tâches de l'incubation et de l'élevage des jeunes.



Nidification

Malgré une relative abondance de l'espèce dans la nature, les données émanent surtout d'observations en captivité. Quelques observations en milieu naturel montrent que les nids sont souvent situés au pied des arbres ou dans une simple cavité du sol recouverte de feuilles.

Distribution

Centre et sud de la Chine, Hainan, Myanmar, Viêt Nam, Laos, Cambodge, Thaïlande.

Habitat

Le faisán argenté habite surtout les versants enherbés et buissonneux parsemés de pitons rocheux en lisière de forêt. Il pénètre aussi dans les clairières et les bois clairs mais évite généralement la forêt dense.



Œuf de Faisan argenté - Muséum de Toulouse

Sous-espèces

- *L. n. nycthemera* Linné, 1758 : sud de la Chine (Kouangsi, Kouangtong, nord Viêt Nam, à l'est du fleuve rouge).
- *L. n. occidentalis* Delacour, 1948 : nord-ouest du Yunnan et nord-est du Myanmar.
- *L. n. rufipes* (Oates, 1898) : nord-est du Myanmar (nord de l'État Chan, entre les rivières Irraouddi et Salouine).
- *L. n. ripponi* (Sharpe, 1902) : nord-est du Myanmar (sud de l'État Chan).
- *L. n. jonesi* (Oates, 1903) : centre-sud de la Chine (sud-ouest du Yunnan), centre et nord de la Thaïlande, Myanmar (sud de l'État Chan).
- *L. n. omeiensis*, Cheng *et al.* 1964 : centre de la Chine (Seutchouan).
- *L. n. rongjiangensis* Tan & Wu, 1981 : centre-sud de la Chine (sud-est du Guizhou, sud-est du Koueitchéou).
- *L. n. baulieuui* Delacour, 1948 : sud-est du Yunnan, nord du Laos et du Viêt Nam.
- *L. n. whiteheadi* (Ogilvie-Grant, 1899) : île Hainan.
- *L. n. fokiensis* Delacour, 1948 : sud-est de la Chine (nord-ouest du Foukien).
- *L. n. berliozii* (Delacour & Jabouille, 1928) : centre du Viêt Nam (versant ouest des monts Annamitiques)
- *L. n. beli* (Oustalet, 1898) : centre du Viêt Nam (versant est des monts Annamitiques).
- *L. n. engelbachi* Delacour, 1948 : sud du Laos (plateau des Bolovens).
- *L. n. annamensis* (Ogilvie-Grant, 1906) : sud du Viêt Nam (sud d'Annam).
- *L. n. lewisi* (Delacour & Jabouille, 1928) : sud-est du Cambodge et sud-est de la Thaïlande.

Sybile Moulin, dans sa thèse (2003), a étudié la validité de ces sous-espèces par des études morphologiques, génétiques et biogéographiques. D'après les analyses morphologiques, elle distingue trois groupes : celui du nord, nycthemera et fokiensis ; celui du sud, lewisi, annamensis, engelbachi et beli ; un groupe intermédiaire constitué de rufipes, jonesi, occidentalis, ripponi et

beaulieui. Elle ne se prononce pas sur omeiensis et rongjiangensis faute d'échantillons. L'analyse moléculaire ne fait ressortir que deux clades : l'un situé à l'est du fleuve rouge (nycthemera, fokiensis, berliozzi et whiteheadi), l'autre situé à l'ouest (rufipes, jonesi, occidentalis, ripponi, beaulieui, lewisi, annamensis et engelbachi). Les autres formes n'ont pas été analysées faute d'échantillons utilisables. Finalement, elle ne conserve que les sous-espèces nycthemera (incluant nycthemera et fokiensis) ; rufipes (regroupant rufipes, jonesi, ripponi, beaulieui, occidentalis) ; annamensis (incluant annamensis et engelbachi) ; et whiteheadi. Elle garde également beli, rongjiangensis et omeiensis, au bénéfice du doute, faute d'échantillons suffisants.

Statut, conservation

L'espèce est considérée comme globalement non menacée et même commune ou très commune et stable en Chine mais plusieurs sous-espèces notamment au Viêt Nam, en Thaïlande et au Cambodge sont plus ou moins menacées.

Bibliographie

- Hennache, A. & Ottaviani, M. (2005). *Monographie des faisans*, volume 1, 357 pages. Éditions WPA France, Clères, France.
- Moulin, S. (2003). Phylogénie de deux espèces de faisans, le faisan argenté *Lophura nycthemera* et le faisan leucomèle *Lophura leucomelanos* : études morphologique, chromosomique, moléculaire et biogéographique. Thèse du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. Non publié.

Liens externes

- **(en)** Référence Congrès ornithologique international : *Lophura nycthemera* dans l'ordre Galliformes (consulté le 20 mai 2015)
- **(fr+en)** Référence Avibase (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Lophura nycthemera* (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=D793F5FE02243325>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=D793F5FE02243325>)) (consulté le 30 juin 2015)
- **(en)** Référence Tree of Life Web Project (<http://tolweb.org/tree/phylogeny.html>) : *Lophura nycthemera* (<http://tolweb.org/Lophura+nycthemera>)
- **(en)** Référence Animal Diversity Web : *Lophura nycthemera* (http://animaldiversity.org/accounts/Lophura_nycthemera/)
- **(en)** Référence NCBI : *Lophura nycthemera* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=9046)
- **(en)** Référence UICN : espèce *Lophura nycthemera* (Linnaeus, 1758) (<http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22679220>) (consulté le 30 juin 2015)

Sur les autres projets Wikimedia :

Faisan argenté (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lophura_nycthemera?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Faisan argenté, sur Wikispecies

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Faisan_argenté&oldid=116432855 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 30 juin 2015 à 17:02.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.