

Amazone à front bleu

Amazona aestiva

L'**Amazone à front bleu** (*Amazona aestiva*) est une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae (la famille des perroquets).

Sommaire

Caractéristiques

Habitat et répartition

Écologie et comportement

Alimentation

Reproduction

Classification

Sous-espèces

Conservation

Élevage

Notes et références

Liens externes

Caractéristiques

L'oiseau mesure entre 35 et 38 cm¹ (soit un peu plus que la moyenne au sein du genre *Amazona*), pour une masse d'environ 450 g.

C'est un oiseau trapu à plumage vert écaillé de jaune sur les parties ventrales. La zone autour des yeux est jaune et le front bleu pâle². Les épaules sont rouges ainsi que les miroirs alaires à la base des cinq premières rémiges secondaires. Les rémiges primaires sont bleu violet. La queue est verte nuancée de jaune. Les yeux sont entourés de peau claire avec des iris foncés cerclés d'orange. Cet oiseau dispose d'un bec robuste gris foncé (presque noir), tout comme la cire et les pattes.

Les jeunes ressemblent aux adultes mais ont les couleurs faciales bleues et jaunes presque absentes ou très nuancées ainsi que les iris châtain³. Les jeunes

Amazona aestiva



Amazone à front bleu (Mato Grosso, Brésil).

Classification (COI)

| | |
|---------------|-----------------------|
| Règne | <u>Animalia</u> |
| Embranchement | <u>Chordata</u> |
| Classe | <u>Aves</u> |
| Ordre | <u>Psittaciformes</u> |
| Famille | <u>Psittacidae</u> |
| Genre | <u><i>Amazona</i></u> |

Espèce

Amazona aestiva
(**Linnaeus, 1758**)

Statut de conservation UICN

obtiennent leur couleurs définitives à la maturité sexuelle vers l'âge de 3 à 4 ans⁴.

Il n'existe aucun dimorphisme sexuel visible.

Cet oiseau peut vivre environ 40 ans² (jusqu'à 80 ans en captivité) ^[réf. nécessaire].

Habitat et répartition

Son habitat se situe en Amérique du Sud, du Brésil au Paraguay et de la Bolivie à l'Argentine.

Écologie et comportement

Alimentation

Cet oiseau se nourrit de graines, de noix et de baies. Il est frugivore et granivore.

Reproduction

Classification

Sous-espèces

D'après la classification de référence (version 5.2, 2015) du Congrès ornithologique international, cette espèce est constituée des deux sous-espèces (ordre phylogénique) :


- *Amazona aestiva aestiva* du Brésil ;
- *Amazona aestiva xanthopteryx* connue sous le nom d'Amazone à front bleu du Paraguay ou d'Amazone à ailes jaunes, très proche de la forme précédente avec comme seules différences que le jaune est plus étendu et le rouge des épaules et le bleu de la face sont plus marqués.

Conservation


Le commerce de cette espèce est réglementé par l'annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Élevage

L'Amazone à front bleu est utilisé comme animal de compagnie, c'est l'un des psittacidés de compagnie les plus courants. Il est élevé en captivité à cet effet.




Statut CITES

 Annexe II, Rév. du 12/01/2005



Un couple, au Brésil.



Amazone à front bleu.

La reproduction commence en général vers fin mars début mai. Le mâle devient alors très nerveux et peu se montrer très agressif envers son soigneur. La femelle pond de 3 à 5 œufs qu'elle couve seule pendant 25-26 jours. Le mâle nourrit sa femelle au nid. Quand les petits naissent le mâle participe au nourrissage. Les jeunes sont sevrés vers l'âge de 3 mois.

L'amazone s'attache à une personne en particulier, il peut en devenir "amoureux". Il peut devenir agressif envers d'autres personnes s'il ne les accepte pas. Il fait en quelque sorte sa sélection de personne pouvant l'approcher.

En captivité il est nourri d'un mélange de graines pauvres en graisses, de fruits et légumes de toutes sortes sauf le citron et le pamplemousse trop acides, les pommes de terre et les avocats (les oiseaux digèrent mal l'amidon). On peut aussi leur donner des bourgeons d'arbres fruitiers, du pissenlit, du plantain, du mouron des oiseaux (à fleurs blanches) et du chardon. Les baies telle que le pyracantha, sorbier des oiseaux, églantines, cotonéasters lacteus etc., sont très appréciées.



Poussins d'amazone à front bleu âgés de 1 et 2 jours.

Notes et références

1. Oiseaux.net, « Amazone à front bleu - *Amazona aestiva* - Turquoise-fronted Amazon » (<https://www.oiseaux.net/oiseaux/amazone.a.front.bleu.html>), sur *www.oiseaux.net* (consulté le 5 mars 2020)
2. Admin, « Amazone à front bleu (*Amazona aestiva aestiva*) » (<https://www.perroquet.biz/amazone-a-front-bleu-amazona-aestiva-aestiva/>), sur *Perroquet Mania*, 25 juin 2020 (consulté le 1^{er} juillet 2020)
3. Dominique Mario et Gino Conzo (trad. Giusi Furno et Sandrine Morel), *Le Grand Livre des perroquets*, Paris, de Vecchi, 2004, 287 p. (ISBN 2732835404, OCLC 420002720 (<https://worldcat.org/oclc/420002720&lang=fr>))
4. angelk, « L'Amazone à front bleu, ou *Amazona aestiva*, un clown bavard dans un corps de perroquet » (<http://www.animogen.com/2013/06/18/lamazone-a-front-bleu-ou-amazona-aestiva-un-clown-bavard-dans-un-corps-de-perroquet/>), sur *animOgen*, 18 juin 2013 (consulté le 1^{er} juillet 2020)

Liens externes

- (fr) Référence *Oiseaux.net* : *Amazona aestiva* (<https://www.oiseaux.net/oiseaux/amazone.a.front.bleu.html>) (+ répartition (<https://www.oiseaux.net/maps/amazone.a.front.bleu.html>))
- (en) Référence *Congrès ornithologique international* : *Amazona aestiva* dans l'ordre *Psittaciformes* (consulté le 7 mai 2015)
- (en) Référence *Zoonomen Nomenclature Resource* (<http://www.zoonomen.net>) (Alan P. Peterson) : *Amazona aestiva* dans *Psittaciformes* (<http://www.zoonomen.net/avtax/psit.html>)
- (fr+en) Référence *Avibase* (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758) (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=4B268FD25510C6CB>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=4B268FD25510C6CB>)) (consulté le 26 avril 2016)

Sur les autres projets Wikimedia :

Amazone à front bleu (https://commons.wikimedia.org/wiki/Amazona_aestiva?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Amazone à front bleu, sur Wikispecies

- (en) Référence CITES : espèce *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758) (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/7524/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/7524/distribution) sur *Species+*) (consulté le 7 mai 2015)
- (en) Référence Animal Diversity Web : *Amazona aestiva* (http://animaldiversity.org/accounts/Amazona_aestiva/)
- (en) Référence NCBI : *Amazona aestiva* (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=12930)
- (en) Référence UICN : espèce *Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758) (<http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22686332>) (consulté le 7 mai 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazone_à_front_bleu&oldid=172515691 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 1 juillet 2020 à 11:33.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.