

Heliconius sara

Heliconius sara est un lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae, à la sous-famille des Heliconiinae et au genre *Heliconius*.

Sommaire

Dénomination

Synonymes
Noms vernaculaires
Taxinomie

Description

Chenille

Biologie

Période de vol et hibernation
Plantes hôtes

Écologie et distribution

Biotope

Notes et références

Annexes

Articles connexes
Liens externes

Dénomination

Heliconius sara a été décrit par l'entomologiste danois Johan Christian Fabricius en 1793¹, sous le nom initial de *Papilio sara*.

Synonymes

- Papilio sara* (Fabricius, 1793) protonyme²

Noms vernaculaires

Heliconius sara se nomme Sara Longwing en anglais.

Taxinomie

Sous-espèces


Heliconius sara



heliconius sara sara - MHNT

Classification

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Arthropoda</u>
Classe	<u>Insecta</u>
Ordre	<u>Lepidoptera</u>
Famille	<u>Nymphalidae</u>
Sous-famille	<u>Heliconiinae</u>
Genre	<u><i>Heliconius</i></u>



Heliconius sara sara △ - Muséum de Toulouse

Nom binominal

Heliconius sara
(Fabricius, 1793)

- *Heliconius sara sara* (Fabricius, 1793) présent au Suriname et au Brésil.

Synonymie pour cette sous espèce

Papilio rhea (Cramer, 1775)³
Heliconius sara thamar (Hübner, 1806)
Nerëis thamar (Hübner, 1806)⁴
Heliconius rhea ab. albinea (Riffarth, 1899)
Heliconius sara praesignis (Stichel, 1919)
Heliconius sara thamar f. nana (Stammeshaus, 1982)

- *Heliconius sara apseudes* (Hübner, [1813])
- *Heliconius sara brevimaculata* Staudinger ; présent en Colombie.
- *Heliconius sara elektraa* Neukirchen, 1998 ; présent en Colombie.
- *Heliconius sara fulgidus* Stichel, 1906 ; au Guatemala, au Costa Rica et à Panama.
- *Heliconius sara magdalena* (Bates, 1864)⁵ ; à Panama, en Colombie et au Venezuela.

Synonymie pour cette sous espèce

Heliconius apseudes var. magdalena ab. albimacula (Staudinger, 1897)⁶
Heliconius sara ab. albula (Riffarth, 1900)⁷
Heliconius sarae lilianae (Emsley, 1965)

- *Heliconius sara sprucei* (Bates, 1864)⁸ ; en Équateur.
- *Heliconius sara theudela* (Hewitson, 1874)⁹ au Costa Rica et à Panama.
- *Heliconius sara veraepacis* (Bates, 1864)¹⁰ ; au Venezuela.
- *Heliconius sara williami* (Neukirchen, 1994)¹¹ ; à Trinidad^{2, 12}.

Description

C'est un très grand papillon au dessus noir avec une partie médiane bleu métallique et deux bandes blanches sur les ailes antérieures.

Le dessous est marron foncé à noir avec les mêmes bandes blanches et des points rouges à la base des ailes¹³.

Chenille

La chenille est jaune rayée de bandes noires avec une tête et des cornes noires¹⁴.

Biologie

Les mâles sont attirés par les phéromones émises par les chrysalides femelles et sont en attente pour féconder les femelles dès leur émergence^{13, 14}.

Période de vol et hibernation

Il vole toute l'année.

Sa période imago dure 2 à 3 mois.

Plantes hôtes

La plante hôte est une *Passiflora* ou passiflore, *Passiflora auriculata*[?].

Écologie et distribution

Il réside dans le sud du Mexique, en Amérique centrale et dans le bassin amazonien[?].

Biotope

Son habitat est la forêt tropicale où il se tient dans la canopée.

Notes et références

- Fabricius, 1793; Ent. Syst. 3 (1): 167
- funet (<http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/nymphalidae/heliconiinae/heliconius/index.html>)
- Cramer, [1775]; Uitl. Kapellen 1 (1-7): 85, pl. 54, f. C, D
- Hübner, [1806]; Samml. exot. Schmett. 1 : pl. [16]
- Bates, 1864; Ent. mon. Mag. 1 (3): 57,
- Staudinger, [1897]; Dt. Ent. Z. Iris 9 (2) : 292
- Riffarth, 1900; Berl. ent. Zs. 45 (3/4) : 208
- Bates, 1864; Ent. mon. Mag. 1 (3): 57
- Hewitson, 1874; Ent. mon. Mag. 10 (118) : 224
- Bates, 1864; Ent. mon. Mag. 1 (3): 57
- Gerardo Lamas, 2004; Atlas of Neotropical Lepidoptera; Checklist: Part 4A; Hesperioidea - Papilionoidea
- groupe Charitonia sur cahurel-entomologie (http://www.cahurel-entomologie.com/texte_heliconius/groupe_charitonia.html)
- the firefly forest (<http://fireflyforest.net/firefly/2006/06/16/sara-longwing-butterfly/>)
- Tree of Life (http://tolweb.org/Heliconius_sara/72943)

Annexes

Articles connexes

- Lépidoptère
- Mimétisme

Liens externes

- groupe Charitonia sur cahurel-entomologie (http://www.cahurel-entomologie.com/texte_heliconius/groupe_charitonia.html)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliconius_sara&oldid=156138720 ».

Sur les autres projets Wikimedia :

Heliconius sara (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heliconius_sara?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Heliconius sara, sur Wikispecies

La dernière modification de cette page a été faite le 25 janvier 2019 à 08:39.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence [Creative Commons attribution](#), [partage dans les mêmes conditions](#) ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. [Voyez les conditions d'utilisation](#) pour plus de détails, ainsi que [les crédits graphiques](#). En cas de réutilisation des textes de cette page, [voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence](#).

Wikipedia® est une marque déposée de la [Wikimedia Foundation, Inc.](#), organisation de bienfaisance régie par le [paragraphe 501\(c\)\(3\)](#) du code fiscal des États-Unis.