

Bubalus bubalis

Le **buffle domestique** est un bovin de grande taille, l'espèce-type du genre *Bubalus*, qui comprend plusieurs autres espèces endémiques d'Asie tropicale.

Il est connu en français sous les noms de **buffle d'Asie**, **buffle des marais** (*B. b. bubalis*) et **buffle des rivières** (*B. b. kerabau*). La femelle est la bufflonne, le petit, le bufflon. En d'autres langues, et selon les races et les pays, il a plusieurs noms : *arni*, *karbau*, *kerabaiü*…

L'appellation pour cette espèce de « *buffle d'eau* », traduction littérale de l'anglais *water buffalo* que l'on rencontre parfois, est un pléonasme en français mais pas en anglais où elle sert à distinguer le buffle du bison également appelé *buffalo*. En effet le buffle, accoutumé à l'état sauvage aux milieux humides, reste très attiré par les zones aquatiques et il n'existe pas de « *buffle de terre* », à moins d'appeler ainsi l'espèce sauvage africaine *Syncerus sp.*, qui forme un autre genre à la morphologie différente.

À l'état sauvage, le buffle d'Asie est une espèce en danger, dont l'habitat typique est les marais d'Asie du Sud et du Sud-Est. Sous sa forme domestiquée, c'est un animal courant en Chine, dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est, particulièrement apprécié pour son lait et en tant qu'animal bât et de labour.

La bufflonne est aussi élevée en Europe pour son lait en Roumanie et en Italie, notamment en Campanie, pour la production de la mozzarella. On a des os archéologiques attestant la présence du buffle domestique dès l'époque archaïque, à l'aube de l'Antiquité, tant dans les Balkans, en Anatolie, Syrie, Mésopotamie et Perse qu'en Italie.

Bubalus bubalis



Bubalus bubalis en Thaïlande


Classification selon MSW

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Sous-embr.	<u>Vertebrata</u>
Classe	<u>Mammalia</u>
Ordre	<u>Artiodactyla</u>
Famille	<u>Bovidae</u>
Sous-famille	<u>Bovinae</u>
Genre	<u><i>Bubalus</i></u>


Nom binominal


Bubalus bubalis
(Linnaeus, 1758)

Statut de conservationUICN




Statut CITES

 Annexe I , Rév. du 1975-01-07



Buffle en terre cuite, 2300 avant notre ère, Lopburi, Thaïlande



Buffle à roulettes, jouet d'enfant. Terre cuite, Grande Grèce (Italie du Sud), époque archaïque.



Buffles, par Pisanello (vers 1420-1440)



Csordás (« bouviers ») en Hongrie au xix^e siècle.

Comme chez le bœuf domestique, il existe plusieurs races, dont certaines ont été exportées loin de leurs terres d'origine : aujourd'hui, le buffle est élevé en Tunisie, mais aussi au Brésil, où il a été introduit sur île de Marajó, et dans le nord de l'Australie, où des bêtes échappées des élevages ont eu tendance à proliférer et sont devenues du gibier

Dans le Midi de la France, quelques fermes en élèvent pour la viande et le lait, tandis que dans les Hauts-de-France un troupeau est utilisé pour gérer le marais de Sacy¹. Une population libre a été introduite aux Pays-Bas, dans le polder d'Overdiepse².



Trois buffles d'Asie (Bubalus bubalis) se baignant dans le Mékong à Don An (Si Phan Don, Laos) avec leurs têtes au-dessus de l'eau. Ces buffles se rafraîchissent souvent dans l'eau (ou dans la boue), quand il fait chaud. Ces animaux de labour ont une corde infiltrée entre les narines pour faciliter leur maîtrise, bien qu'ici en mars ils ne soient pas attachés, et sont donc libres de circuler partout sur l'île, allant même parfois jusqu'à traverser la rivière.

Sommaire

Le buffle sauvage (Bubalus arnee bubalis)

Bibliographie

Références

Articles connexes

Liens externes

Le buffle sauvage (Bubalus arnee bubalis)

La population sauvage qui compterait moins de 3 500 individus matures est principalement répartie en Inde, au Népal, au Bhoutan et en Thaïlande. Quelques dizaines d'individus subsistent au Cambodge, au Myanmar et en Malaisie péninsulaire. La population de Bornéo pourrait être croisée avec des individus marrons (voir marronnage), il en va de même pour la population du Sri Lanka.

Les principales menaces qui pèsent sur les buffles sont le braconnage, l'hybridation avec la population domestique, les maladies, la destruction de leur écosystème, le morcellement de leur habitat et les catastrophes naturelles.

Les buffles vivent principalement dans les marais, la jungle et la savane arborée du sud et du sud-est asiatique. En général, les buffles sauvages vivent en troupeaux d'une trentaine d'individus qui se nourrissent principalement d'herbes, de plantes aquatiques voire de fruits et de feuilles d'arbre. Les principaux prédateurs du buffle sont le tigre, l'homme et le crocodile pour les bufflons. Le buffle est le second plus grand bœuf sauvage après le gaur et pèse de 700 à 1 200 kg, il possède les plus grandes cornes chez les ruminants : elles peuvent mesurer deux mètres.



Bufflon, Inde.



Le statut des buffles sauvages fait débat au Sri Lanka, ici au Parc national de Yala



Buffles domestiques en Roumanie



Deux *Bubalus bubalis* (buffles d'Asie) se baignant dans une mare de Don Det (Si Phan Don, Laos) levant haut leurs museaux et fixant l'observateur



Réflexion dans l'eau d'un buffle d'Asie se baignant près de l'île de Don Det (Si Phan Don, Laos). Mai 2018.

Bibliographie

- B. D. Scherf, *World watch list for domestic animal diversity* éd. de la F.A.O., 3-e édition, Rome 2000.

Références

1. Groupe Zones humides, 2018, *Zones Humides Infos* n° 94: *Pâturage traditionnel ou original en zone humide* La gestion des marais de Sacy par le buffle domestique, C. Galet, « Zones Humides Infos n°94: Pâturage traditionnel ou original en zone humide » (<http://www.snnpn.com/produit/n94-1er-semester-2017-paturage-traditionnel-ou-original-en-zone-humide/>), sur <http://snpn.com>, 2018
2. Global Invasive Species Database (GISD 2017), espèce *Bubalus bubalis* sur on 30-11-2017 (<http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=1853>) et Daniel Münter, film *Pays-Bas : le pacte avec l'eau* à 43 min 06 s sur [1] (<https://www.arte.tv/fr/videos/065302-003-A/planete-d-eau/>)

Articles connexes


- Bubalus
- Buffle
- Kwaï Tanoo, statuette thaïlandaise représentant un buffle d'eau
- Liste des races de buffles
- Buffle du Levant

Liens externes

- **(en)** Référence *Mammal Species of the World* (version 3, 2005): *Bubalus bubalis*
- **(fr)** Référence CITES : taxon *Bubalus arnee* (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 16 mai 2015)

Sur les autres projets Wikimedia :

- **(fr+en)** Référence ITIS : *Bubalus bubalis* (Linnaeus, 1758) (+ version anglaise)
- **(en)** Référence Animal Diversity Web : *Bubalus bubalis*
- **(en)** Référence NCBI : *Bubalus bubalis*
- **(en)** Référence UICN : espèce *Bubalus arnee* Kerr, 1792 (consulté le 16 mai 2015)
- **(en)** Référence Fonds documentaire ARKive: *Bubalus bubalis*

 *Bubalus bubalis*, sur Wikimedia Commons

 *Bubalus bubalis*, sur Wikispecies

Ce document provient de «https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bubalus_bubalis&oldid=156385287».

La dernière modification de cette page a été faite le 2 février 2019 à 06:55.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.