

Kobus leche

Le Cobe de Lechwe (*Kobus leche*) est une espèce d'antilopes du delta de l'Okavango

Sommaire

Description

Alimentation

Comportement

Reproduction

Habitat et répartition

Menaces

Captivité

Longévité

Sous-espèces

Photographie

Notes et références

Voir aussi

Références taxonomiques

Description

Le cobe de Lechwe est une magnifique antilope, le mâle est assez massif et présente un arrière-train surélevé. Les mâles adultes présentent une taille de corps comprise entre 1,5 et 1,8 m de long ; les femelles sont plus petites entre 1,3 et 1,6 m de longueur. Sa queue est petite entre 35 et 45 cm. La hauteur au garrot varie de 95 à 110 cm pour les mâles, contre 85 à 100 cm pour les femelles. Le poids des mâles varie entre 80 et 120 kg maximum (100 en moyenne), tandis que celui des femelles varie entre 50 et 90 kg (70 en moyenne), les femelles sont toujours plus minces. Seul le mâle dispose de longues cornes annelées et de forme caractéristique de 50 à 90 cm qu'il utilise pour se défendre contre ses prédateurs.

Les cobes de Lechwe ont leurs sabots longs, pointus et écartés, ainsi qu'une abondante sécrétion cutanée huileuse qui enduit leurs poils, c'est une adaptation à la vie semi-aquatique¹. Ils nagent avec aisance et endurance dans l'eau et peuvent s'immerger complètement s'ils sont menacés ; ils ne laissent alors apparaître que leurs narines. Méfiants, ils restent près des points d'eau pour s'y réfugier et plonger en cas de danger². S'il ne court pas très vite sur

Kobus leche



Cobe de Lechwe

Classification

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Sous-embr.	<u>Vertebrata</u>
Classe	<u>Mammalia</u>
Sous-classe	<u>Theria</u>
Infra-classe	<u>Eutheria</u>
Ordre	<u>Artiodactyla</u>
Famille	<u>Bovidae</u>
Sous-famille	<u>Reduncinae</u>
Genre	<u><i>Kobus</i></u>

Nom binominal

Kobus leche


Gray, 1850

Statut de conservationUICN



NT : Quasi menacé

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 28/06/1979

terrain sec (40 km/h) à cause de ses sabots, qui sont mieux adaptés aux terrains humides où il est plus à l'aise pour fuir rapidement (6 km/h en pointe)³. Les cobes de Lechwe peuvent aussi faire des bonds assez impressionnants de 2 mètres de hauteur⁴ et 6 mètres de longueur.

Alimentation

Cette antilope se nourrit d'herbes et de plantes aquatiques y compris celles qui, après les avoir piétinées, poussent dans l'eau.

Comportement

Le Cobe de Lechwe est sédentaire, l'essentiel de son activité ayant lieu tôt le matin ou en fin de journée (à la fraîcheur). Il est très sociable puisqu'il vit en groupes constitués de quelques dizaines à quelques centaines de mâles et de femelles. Il est capable de pousser des grognements saccadés et des sifflements.

Reproduction

Les accouplements et les mises bas peuvent avoir lieu toute l'année. Quand le mâle est en rut, il occupe un lieu surélevé pour bien être vu des femelles et de ses rivaux ; Il va alors passer son temps à attirer les femelles et à repousser les mâles. Les cornes annelées servent alors aux combats qui établissent la hiérarchie entre mâles. Ces combats sont surtout rituels et peu violents. Le mâle le plus fort choisit ses femelles qui constituent alors son harem.

La femelle donne naissance à un petit après 7 mois ½ environ de gestation. Quand il naît, le petit pèse environ 5 kg. Il reste caché dans les hautes herbes en l'absence des adultes. L'allaitement, qui a lieu le matin et le soir, dure 4 mois. La maturité sexuelle du Cobe de Lechwe est atteinte à 2 ans ½ pour le mâle et à 18 mois pour la femelle.

Habitat et répartition

Le Cobe de Lechwe se rencontre au sud-est du Zaïre, en Zambie, au nord du Botswana, au nord-est de la Namibie et au sud-est de l'Angola.

Il fréquente les bords marécageux des lacs et des rivières.

Menaces

Durant la saison sèche, il a de nombreux prédateurs lions, léopards, guépards, lycaons, hyènes, pythons et même, pour les jeunes qui sont les plus fragiles, chacals et rapaces. Les crocodiles aussi, mais seulement pendant la saison des pluies où les lacs et les marais sont abondants. Malgré tous ces prédateurs naturels, l'Homme reste le seul responsable du carnage et, de là, des réductions d'effectifs: on estime qu'en 1930, il y avait un million de Cobes de Lechwe, aujourd'hui, il n'en resterait plus que 98 000.

Captivité

Il est présent dans de nombreux zoos, où il se reproduit et s'élève assez facilement.

Il y a de nombreux cobes de Lechwe en France ; dans les parcs de Sigean, Thoiry, Fréjus, Amnéville, Planète Sauvage, Reynou, Bordeaux-Pessac, African Safari, Beauval, Amiens, safari de Peaugres... présentés en semi-liberté, dans le cadre d'une plaine africaine.

Longévité


10 à 15 ans dans la nature, jusqu'à 20 ans en captivité.

Sous-espèces

Il existe 4 sous-espèces dont 1 qui est éteinte :

- *Kobus leche leche* ou le Lechwe rouge que l'on rencontre au nord-ouest de la Zambie, en République Démocratique du Congo, en Angola et au Botswana ;
- *Kobus leche kafuensis* ou le Lechwe de la Kafue que l'on rencontre dans la plaine de la Kafue ;
- *Kobus leche smithemani* ou le Lechwe noir que l'on rencontre dans le bassin du Bangweulu en Zambie ;
- *Kobus leche robertsi* éteinte.

Photographie



Notes et références

1. Zoo le Pal - Animaux - Herbivores - Cobes de Lechwe (<http://www.lepal.com/animaux/herbivores/cobe-de-lechwe>)
2. « Kob Lechwe » (<http://www.reserveafricainesigean.fr/fiche/lechwe.htm>), sur *Réserve de Sigean* (consulté le 12 février 2010)
3. [1] (<https://www.parcanimalierdauvergne.fr/animal/cobe-de-lechwe/>) Mitesse de 60 km/h du Cobe Lechwe
4. Zoo du bois d'Attilly / le Cobe de Lechwe (<http://www.zoo-attilly.com/herbivore3.html>)



Voir aussi

Cobe de Mrs Gray

Références taxonomiques

- **(en)** Référence *Mammal Species of the World* (version 3, 2005) : *Kobus leche*
- **(en)** Référence *Tree of Life Web Project* : *Kobus leche*
- **(fr)** Référence *Catalogue of Life* : *Kobus leche* Gray, 1850
- **(fr)** Référence *CITES* : *taxon Kobus leche* (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 22 mai 2015)
- **(fr+en)** Référence *ITIS* : *Kobus leche* Gray, 1850 (+ *version anglaise*)
- **(en)** Référence *Animal Diversity Web* : *Kobus leche*
- **(en)** Référence *NCBI* : *Kobus leche*
- **(en)** Référence *UICN* : espèce *Kobus leche* Gray, 1850 (consulté le 20 septembre 2017)
- **(en)** Référence *CITES* : espèce *Kobus leche* Gray, 1850 (+ *répartition*) (sur le site de *Species+*) (consulté le 22 mai 2015)
- **(en)** Référence *Fonds documentaire ARKive* : *Kobus leche smithemani*

Sur les autres projets Wikimedia :

-  *Kobus leche*, sur Wikimedia Commons
-  *Kobus leche*, sur Wikispecies

Ce document provient de «https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobus_leche&oldid=153297843».

La dernière modification de cette page a été faite le 23 octobre 2018 à 09:53.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.