

Mangouste brune

La **mangouste brune** ou **crossarche brune** (*Crossarchus obscurus*) est une espèce de la famille des mangoustes. Elle est décrite en 1825 par Frédéric Cuvier.

Sommaire

Description

Répartition et habitat

Activité

Prédateurs

Alimentation

Comportement social

Reproduction

Annexes

Description

Allure semblable à celle de la mangue rayée mais elle a la tête et le museau plus longs. Elle a la lèvre supérieure et le nez très proéminents par rapport à la lèvre inférieure. Elle a des pattes noires avec cinq doigts terminés par de longues griffes. Elle a 6 mamelles et une mâchoire de 36 dents comme la mangue rayée. Elle a un pelage court sur la tête et la gorge, plus clairsemé sur le ventre que sur le dos. Elle a des poils longs hirsutes et un peu raides. Elle a un dessus qui varie de brun foncé à brun noir

Hauteur : 15 à 25 cm, envergure : 18 à 20 cm, pour un poids de 1 à 1,5 kg.

Elle fait des signaux de contact pendant la recherche de nourriture avec des gazouillis. Quand elle se sent menacée elle hérissé ses poils et grogne.

Elle a une vue, une ouïe et un odorat excellents.

Répartition et habitat

Forêt pluviale de la Gambie et de la Sierra Leone au centre et au Sud du Cameroun et au Gabon.

Forêts pluviales et montagnes jusqu'à 2000 m.

Crossarchus obscurus



Mangouste brune photographiée au zoo de Plzeň (Tchéquie)

Classification

<u>Règne</u>	<u>Animalia</u>
<u>Embranchement</u>	<u>Chordata</u>
<u>Sous-embr.</u>	<u>Vertebrata</u>
<u>Classe</u>	<u>Mammalia</u>
<u>Ordre</u>	<u>Carnivora</u>
<u>Famille</u>	<u>Herpestidae</u>
<u>Sous-famille</u>	<u>Herpestinae</u>
<u>Genre</u>	<u><i>Crossarchus</i></u>

Nom binominal

Crossarchus obscurus
(Cuvier, 1825)

Activité

Elle est diurne elle passe la nuit dans des terriers à plusieurs issues, souvent des anciennes termitières.

Prédateurs

C'est la proie des grands carnivores et rapaces diurnes.

Alimentation

Elle se nourrit de vers, de cloportes, de millepattes, de scolopendres, d'araignées, d'insectes, d'escargots, (qui sont flairés et déterrés) de crabes, de poissons, de batraciens, de serpents (même venimeux), de petits mammifères et d'oiseaux, de fruits et autres substances végétales, et des œufs.

Comportement social

En groupes familiaux jusqu'à une douzaine d'individus.


Reproduction

La période de gestation est de 10 semaines. La portée est de 2 à 4 petits (généralement 4). La période de reproduction est indépendante de laison. En une année il y a 2 à 3 portées possibles.


La mangouste brune commence à s'accoupler à 9 mois.

Elle vit 4 ans et demi en captivité.

Annexes



Sur les autres projets Wikimedia :

 [Crossarchus obscurus](#) sur Wikimedia Commons

 [Crossarchus obscurus](#) sur Wikispecies

Ce document provient de «https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mangouste_brune&oldid=155139488».

La dernière modification de cette page a été faite le 27 décembre 2018 à 10:45.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.