

# Kangourou gris

Le **kangourou gris** (*Macropus fuliginosus* ; en anglais : **Western grey kangaroo**) est un grand macropus très commun dans tout le Sud de l'Australie. Il ressemble beaucoup au kangourou géant. Sa population était estimée à 3 000 000 d'individus en 1996.

## Sommaire

**Description**

**Distribution et habitat**

**Mode de vie**

**Alimentation**

**Reproduction**

**Prédateurs**

**Liens externes**

## Description

Il mesure entre 0,9 et 1,4 m de haut avec une queue de 0,75 à 1 m et un poids de 15 à 54 kg. Le mâle est sensiblement deux fois plus gros que la femelle (54 kg contre 28). Il a un pelage épais, grossier dont la couleur varie du gris clair au « chocolat » ; le cou, la poitrine et le ventre sont plus clairs. La tête, petite avec un poil plus fin que chez les autres kangourous, porte deux grandes oreilles. Le mâle a une odeur très forte, désagréable, qui lui vaut le surnom de « le puant » (en anglais : « *the stinker* »).

## Distribution et habitat

On le trouve depuis labaie Shark en Australie Occidentale jusqu'au bassin Murray-Darling en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland. On ne le trouve pas au Nord du Tropique du Capricorne et dans les régions fertiles du Sud-Est.

Il habite les bois, les savanes et les prairies des régions semi-arides.

## Mode de vie

C'est un animal nocturne qui vit en bandes (un « mob ») d'une quinzaine d'individus.

## Alimentation

### *Macropus fuliginosus*



Kangourou gris

### Classification

Règne	<u>Animalia</u>
Embranchement	<u>Chordata</u>
Sous-embr.	<u>Vertebrata</u>
Classe	<u>Mammalia</u>
Sous-classe	<u>Theria</u>
Infra-classe	<u>Metatheria</u>
Ordre	<u>Diprotodontia</u>
Sous-ordre	<u>Macropodiformes</u>
Famille	<u>Macropodidae</u>
Sous-famille	<u>Macropodinae</u>
Genre	<u><i>Macropus</i></u>

Il se nourrit d'herbes mais aussi de branchages, d'écorces et de pousses d'arbres. Il est capable de vivre avec très peu d'eau.

## Reproduction

Il n'y a pas de saison de reproduction particulière mais un pic au printemps et en été. Les mâles se battent entre eux. Généralement, seul le mâle dominant s'accouple. La période de gestation est de 30 jours, après quoi l'embryon passe dans la poche marsupiale pour 130 à 150 jours.

## Prédateurs



Le kangourou a 3 prédateurs : Le dingo, le serpent et bien sûr les braconniers.

## Liens externes

- (en) Référence UICN : espèce *Macropus fuliginosus* Desmarest, 1817 (consulté le 22 mai 2015)
- [1]
- [2]

Sous-genre	<i>Macropus</i> ( <i>Macropus</i> )
<b>Nom binominal</b>	
<i>Macropus fuliginosus</i>	
Desmarest, 1817	
<b>Statut de conservationUICN</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;">Éteint EX</div><div style="text-align: center;">Menacé EW</div><div style="text-align: center;">Menacé CR</div><div style="text-align: center;">Menacé EN</div><div style="text-align: center;">Menacé VU</div><div style="text-align: center;">NT</div><div style="text-align: center;">Préoccup. min. LC</div></div>	
LC : Préoccupation mineure	

Sur les autres projets Wikimedia :

-  *Kangourou gris*, sur Wikimedia Commons
-  *Kangourou gris*, sur Wikispecies

Ce document provient de «[https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kangourou\\_gris&oldid=115240696](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kangourou_gris&oldid=115240696)».

La dernière modification de cette page a été faite le 22 mai 2015 à 01:16.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.